



Utrzymywanie świń użytkowanych rozpłodowo



Utrzymywanie świń rozplodowych



Świnie są zwierzętami stadnymi i potrzeby behawioralne wpływają na techniki utrzymywania ich w różnych grupach produkcyjnych. Jedynie knury wymagają utrzymywania indywidualnego ze względu na wysoką agresję i konkurencję w stadzie.



Utrzymywanie knurów

- ▶ Utrzymywane indywidualnie
- ▶ Kojec ze ściółką umożliwiający dogodny ruch
- ▶ Kojec wyposażony w koryto i poidło
- ▶ Pomieszczenia zapewniające dostateczną ilość światła oraz stałe parametry mikroklimatu
- ▶ Wybiegi bardzo wskazane, 50 - 60m²/szt. 80% może mieć naturalne podłoże, 1/3 winna być zadaszona



Utrzymanie loch

Lochy luźne i prośne można utrzymywać w następujących systemach:

- ▶ Otwarty
- ▶ Alkierzowy
 - ▶ Stanowiska
 - ▶ Kojce grupowe
 - ▶ Kojce - kombiboks
 - ▶ Halowe



System otwarty

Rzadko stosowany w Polsce. Zapewnia zwierzętom wysoki dobrostan i pozwala utrzymać dobrą kondycję. Dla jednej lochy z przychówkiem należy przeznaczyć 50-600m² powierzchni.



Alkierzowy - stanowiska

- ▶ Umożliwia indywidualne traktowanie loch
- ▶ Lochy nie walczą ze sobą i efektywniej wykorzystują paszę
- ▶ Utrzymywane są lochy luźne i karmiące
- ▶ Locha nie może się obracać ani poruszać po kojcu
- ▶ Max prawo dopuszcza utrzymanie do 4 tyg. W tym systemie



Alkierzowy - grupowe

- ▶ System tradycyjny
- ▶ Grupy loch 3 - 5 szt. w kojcu
- ▶ Utrzymywane na ściółce
- ▶ Lochy w tym samym stanie fizjologicznym



Alkierzowy - halowy

- ▶ Grupy loch 25 - 50 sztuk w różnych stanach fizjologicznych
- ▶ Lochy żywione indywidualnie za pomocą komputerowej stacji paszowej
- ▶ Dzienna dawka podzielona na kilka odpasów
- ▶ Po zakończeniu jedzenia locha systemem bramek przemieszcza się do części legowiskowej kojca
- ▶ Wymuszona aktywność loch zapewniająca optymalną kondycję
- ▶ Brak konfliktów o paszę



Alkierzowy - kombiboks

- ▶ W kojcu wyróżniamy dwie części:
 - ▶ Legowiskową
 - ▶ Stanowiskową
- ▶ Część stanowiskowa służy do pobierania paszy
- ▶ Pasza dostarczana jest jednocześnie dla wszystkich zwierząt i każda locha musi wejść do indywidualnego stanowiska
- ▶ Stanowiska żywieniowe mogą być zamykane automatycznie lub ręcznie



Wymagania knurów i loch w zakresie temperatury i wilgotności



Gr. Produkcyjna Świń	Temperatura °C		Wilgotność %
	Minimalna	optymalna	
Knury	12	15	75
Lochy luźne i prośne	12	15	70
Lochy wysoko prośne	15	19	70

Minimalna powierzchnia w kojcach dla knurów i loch



Kategoria zwierząt		Powierzchnia podłogi, m2/szt.
Knury	Krycie w kojcu	10,0
	Bez krycia w kojcu	6,0
Lochy	Indywidualnie na ściółce	1,6
	Indywidualnie bez ściółki	1,4
	Grupowo	2,25
	Lochy karmiące	3,5

Oświetlenie dla loch

- ▶ 40 - 80 lx przez 8 godzin
- ▶ Stosunek świetlny 1 : 20 (powierzchni okien do podłogi)

