


Wychów młodzieży hodowlanej



Wychów młodzięży hodowlanej

- ▶ Młodziężą hodowaną są knurki i loszki w wieku do 8 miesięcy, pochodzące od rodziców wpisanych do ksiąg zarodowych
- ▶ Prowadzony przez chlewnie zarodowe



Maksymalny udział pasz energetycznych i białkowych w mieszankach dla młodzięży hodowlanej, %



Surowiec paszowy	% udział
Zboża: pszenica, jęczmień, kukurydza	70
Owies	10
Otręby pszenne	10 - 15
Śruty poekstrakcyjne: sojowa, słonecznikowa	15 - 20
Nasiona roślin strączkowych: bobik, groch	10
Mączka rybna	3 - 5

Żywienie knurków hodowlanych

- ▶ Zapewnienie właściwego wzrostu, rozwoju i budowy ciała, dużej aktywności płciowej i dobrej jakości nasienia
- ▶ Knurki rosną szybciej i odkładają w przyroście dobowym więcej białka niż loszki i wieprzki
- ▶ Żywienie do woli do 110kg masy ciała
- ▶ Ważny poziom aminokwasów egzogennych - przyspieszają dojrzewanie płciowe, stymulują popęd płciowy



Żywienie knurków hodowlanych

- ▶ Wit. A - ruchliwość plemników, popęd płciowy
- ▶ Wit. E i selen - jakość nasienia
- ▶ Wit. H (biotyna) - stan racic
- ▶ Cynk - nabłonek kanalików rozrodczych jąder, stymuluje dojrzewanie plemników
- ▶ Mangan - zwiększa libido, zapobiega zwyrodnieniom jąder
- ▶ Wapń i fosfor - zapobiega mineralizacji kości (8,5g/kg paszy, 6,5g/kg paszy)
- ▶ Owies - korzystny dla rozrodu



Żywienie loszek hodowlanych

- ▶ Loszka w wieku 220 - 240 dni: 120kg, grubość słoniny grzbietowej na wysokości ostatniego żebra 18mm
- ▶ Intensywność żywienia o ok. 15% niższa niż tuczników
- ▶ Ca i P (7,5g/kg paszy, 6,5g/kg paszy)
- ▶ Cynk - wpływa na czynność gonad
- ▶ Biotyna - wpływa na rozwój embrionalny
- ▶ Kwas foliowy - zwiększa przeżywalność zarodków
- ▶ Wit. E i selen - ochrona ciąży i tworzenie przeciwciał



Żywienie loszek hodowlanych

- ▶ 12 - 12,5MJ energii, 13 - 14% białka w paszy
- ▶ Pasze objętościowe do 1,5kg w dawce
- ▶ Do 20tyg. - żywienie intensywne
- ▶ W pierwszym cyklu loszek nie kryje się! Najkorzystniej - w 3 rui
- ▶ Flushing - żywienie bodźcowe na 2 tyg. przed rują
- ▶ Zaraz po pokryciu - niski poziom żywienia



Przyspieszenie dojrzałości płciowej loszek

- ▶ Prawidłowe żywienie
- ▶ Krótkotrwały, łagodny stres spowodowany transportem lub przepędem
- ▶ Kontakt z knurem



Utrzymanie

- ▶ Knurki powyżej 3m-ca utrzymywać w kojcach po 2 - 3 sztuki, po 6 miesiącu pojedynczo
- ▶ Loszki w kojcach grupowych
- ▶ Korzystanie z wybiegów
- ▶ Utrzymanie pojedyncze - powierzchnia $2,7\text{m}^2$, grupowo $1,4\text{m}^2$
- ▶ Temp. Optymalna 15 - 18C, wilgotność 70%
- ▶ Stosunek powierzchni okien do podłogi 1:20
- ▶ Szczepienia obowiązkowe



Przy ocenie eksterieru brane są pod uwagę

- ▶ Ogólna harmonia i szlachetność budowy zwierzęcia oraz czy reprezentuje ono z wyglądu typ swojej rasy i płci
- ▶ Prawidłowe związanie poszczególnych partii ciała, dobra długość boku, szeroki i równy grzbiet, dobrze wykształcone szynki zadnie
- ▶ Mocne i właściwie postawione nogi, swobodny i prawidłowy chód
- ▶ Normalnie i prawidłowo wykształcone organy płciowe
- ▶ Prawidłowo wykształcone i symetrycznie rozmieszczone sutki
- ▶ Kondycja i stan wypielęgnowania



Wymagania

- ▶ Loszki mateczne - 14 sutoń, pozostałe 12 sutoń
- ▶ Sutoń kraterowe - niedopuszczalne
- ▶ Selekcja wstępna w wieku 4 - 8 tyg.
- ▶ Ocena przeżyciowa w wieku 6 - 7 miesięcy
- ▶ U knurków ocena użytkowości rozłodowej matki
- ▶ Cechy rozrodu są nisko odziedziczne - wybór do rozrodu knurków, których matki w pierwszych 3 miotach odchowały więcej prosiąt do 21. dnia niż wynosi średnia dla stada

